



بیمارستان برزویه گنبد کاوس

سقط جنین

واحد حاکمیت بالینی
دفتر آموزش
تأبستان 1391

TEL: 2237294

اشاره :

شماره تلفن مستقیم دفتر ریاست
بی‌مارستان : 2237294 -
0172

شماره تلفن همراه ریاست بی‌مارستان :
09113720038

شماره تلفن همراه بی‌مارستان (خط
ویژه تماس بی‌ماران برای اظهار
نظرات): 09373744484

آدرس ای‌میل بی‌مارستان :
Borzuyeh212@yahoo.com
سامانه پیام کوتاه دانشگاه :
30006738

هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در زمینه بهتر
شدن خدمات بی‌مارستانی ، از طریق سیستم
های ارتباطی فوق منعکس کنی‌د.

پذیرای دیدگاه های سازنده شما هستیم .

با آرزوی بهبودی و سلامت برای بی‌ماران

سقط مکرر:

سقط یک حادثه بسیار شایع است و بسیاری
زنان حتی دو مورد سقط را تجربه می کنند.
اما حتی بعد از دو مورد سقط نیز
غیرمحمتمل است که مشکل زمینه ای
درمیان باشد و همیشه شانسی برای باردار
شدن در آینده وجود دارد.

بعد از سه سقط متوالی توصیه به انجام
آزمایشات برای رد نمودن برخی علل خاص
می گردد.

پیش آگهی:

تأثیر جسمانی یک سقط به سرعت از بین
می رود. هرگونه خونریزی باید پس از ۱۰
روز متوقف گردد و حدود هفته بعد اولین
قاعدگی اتفاق می افتد.

گاهی عفونت می تواند خونریزی را طولانی
تر کند یا منجر به ترشحات خارش دار، بودار
یا سبزرنگ گردد که نیاز به درمان آنتی
بیوتیکی دارد.

سقط جنین

تعریف:

سقط به از دست رفتن ناگهانی حاملگی پیش از هفته ۲۴ حاملگی گفته می شود. سقط از شایعترین علل بستری زنان است. به طور طبیعی در زوجهای بارور حاملگی در ۶۰٪ چرخه های قاعدگی اتفاق می افتد. ۵۰٪ حاملگی ها پیش از لانه گزینی در رحم از دست می روند. ۳۰٪ حاملگی ها بلافاصله پس از لانه گزینی (قبل از آنکه حاملگی از لحاظ بالینی قابل تشخیص باشد) از بین می روند. به طور کلی عواملی که باعث سقط جنین می شوند را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

۱- عوامل سقط جنین

۲- علائم سقط جنین

عوامل سقط جنین:

۱-عوامل جنینی:

-رشد غیرطبیعی تخم ۴۰٪

-ناهنجاریهای ارثی و ژنتیکی جنین ۱۵-۲۵٪

۲-عوامل مادری:

-بیماریهای عفونی مادر

-بیماری مزمن ناتوان کننده مادر

-بیماریهای غدد

-مصرف دارو و عوامل محیطی

-نقص ایمنی بدن

-ناهنجاریهای رحم

-نارسایی دهانه رحم

-سن بالای مادر

علائم سقط جنین:

شایعترین نشانه سقط خونریزی است که می تواند از یک لکه بینی خفیف تا خونریزی شدید متفاوت باشد.

اغلب گرفتگی های عضلانی با دردهای مشابه قاعدگی و کمی درد وجود دارد.

در بعضی زنان علائم معمول حاملگی مانند تهوع - درد پستانی و خستگی ممکن است بدون انتظار متوقف شود.

درمان:

اگر سقط کامل شده باشد دیگر به درمان نیازی نیست.

اگر سقط کامل نشود نیاز به درمان دارد.

-وقتی حاملگی قبلاً بدون خونریزی متوقف شده باشد.

-زمانی که میزان قابل توجهی خونریزی وجود دارد.

درمان با دارو یا جراحی برای برداشتن بافت باقیمانده لازم می شود.

درمان جراحی نیازمند یک بیهوشی کوتاه مدت ۵دقیقه ای برای تخلیه رحم است.