گزارش کوتاه

وضعیت اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به کیست هیداتید جراحی شده در بیمارستانهای شهر قم طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸٦

احمد مردانی
دانشجوی Ph.D انگل،شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

لیلا باباخان
کارشناس ارشد انگل‌شناسی پزشکی، مرکز بهداشت استان قم

فاطمه عابدی آستانه
کارشناس حشره‌شناسی پزشکی، مرکز بهداشت استان قم

مهدی رفیعی
دامپزشک، اداره کل دامپزشکی استان قم

حسن مردانی
کارشناس بهداشت محیط، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی

نویسنده مسئول: احمد مردانی
تلفن : ۳-۷۷۲۹۳۵۱-۰۲۵۱
پست الکترونیک:
ahmadmardani@yahoo.com

آدرس: قم، میدان جهاد، بلوار ۱۵ خرداد، قبل از تقاطع عمار یاسر، پایگاه منطقه‌ای انتقال خون استان قم، کد پستی: ۳۷۱۹۱۶۳۳۳۳، صندوق پستی: ۳۴۹۶

چکیده

زمینه و هدف : *بیماری کیست هیداتید یکی از مهمترین بیماریهای انگلی مشترک انسان و دام است که توسط مرحله لاروی اکینوکوکوس گرانولوزوس (Echinococcus granulosus) ایجاد می‌شود. این بیماری در بسیاری از مناطق جهان و ایران شایع بوده، از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به کیست هیداتید جراحی شده در بیمارستانهای شهر قم طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ اجرا شد.*

روش بررسی: *مطالعه انجام یافته از نوع مقطعی گذشته‌نگر بود. در این مطالعه با بررسی پرونده‌های پزشکی ۱۹ بیمار مبتلا به کیست هیداتید که طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ در بیمارستانهای شهر قم بستری و جراحی شده بودند، مشخصات فردی بیماران شامل جنس، سن، شغل، محل سکونت، تعداد کیست و عضو مبتلا استخراج و ثبت گردید.*

یافته ها : *از تعداد ۱۹ بیمار، ۱۲ نفر (۶۳/۲ درصد) مونث و ۷ نفر (۳۶/۸ درصد) مذکر بودند و بیشترین فراوانی آلودگی (۳۱/۶۵ درصد) در گروه سنی ۲۱-۳۰ سال مشاهده شد. آلودگی در خانمهای خانه‌دار (۵۲/۷ درصد) بیشتر از سایر گروههای شغلی بود و اکثر مبتلایان (۱۷ نفر، ۸۹/۵ درصد) شهرنشین بودند. از نظر اعضای مبتلا، در ۷۳/۷ درصد (۱۴ نفر) موارد کبد و ۲۶/۳ درصد (۵ نفر) موارد ریه درگیری داشت که تمامی بیماران مبتلا به کیست هیداتید ریوی، مذکر بودند.*

نتیجه گیری: *از آنجا که در این مطالعه ۶۳/۲ درصد مبتلایان به کیست هیداتید مونث و از نظر شغلی خانمهای خانه‌دار بیش از سایر گروههای شغلی مبتلا به کیست بودند، ممکن است تماس بیشتر آنها با سبزیهای آلوده به تخم انگل مهمترین علت آلودگی باشد*

واژه های کلیدی: *کیست هیداتید، اپیدمیولوژی، جراحی، ایران*

وصول مقاله:۸۸/۱۲/۱۵
اصلاح نهایی:۸۹/۲/۲۲
پذیرش مقاله:۸۹/٤/٦