

## دستور العمل ایمنی:

\* در صورت پاشیده شدن خون و یا سایر ترشحات آلوده بیمار به: بریدگیهای باز - ملتحمه(چشمها)- غشای مخاطی (داخل دهان و.....)  
گاز گرفتگی که منجر به پارگی اپیدرم شود یا در صورت نیدل استیک شدن.

### کمک های فوری:

- ۱- شستشوی زخم با صابون و آب ولرم
- ۲- کمک به خونروی از محل اولیه زخم (موقع تماش)
- ۳- خودداری از مالش موقعی چشم
- ۴- شستشوی چشمها و غشای مخاطی با مقادیر زیاد آب در صورت آلوگی
- ۵- گزارش فوری سانحه به سوپر وایزر
- ۶- در صورتی که آلوگی منبع تماس (بیمار مددجو) با عفونت HIV محرز باشد الزامی است فرد مزبور مورد تماس در حداقل زمان (ساعت اول) تحت مراقبتها درمانی با نظر متخصص عفونی قرار گیرد.
- ۷- در صورتی که منبع آلوده به عنوان مورد شناخته شده HIV-HBV می باشد ۱۰-۵سی سی خون از فرد مورد تماس گرفته و به منظور پی گیری آنی ذخیره گردد.
- ۸- پس از تماس جهت تعیین عفونت منبع ۱۰-۵سی سی خون از منبع تماس جهت بررسی هپاتیت B و C و HIV اخذ و مورد آزمایش قرار گیرد.